

## ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



### ACIENDEL®

**Acción.** Antiparasitario externo pour-on a base de cipermetrina para bovinos, equinos, ovinos y porcinos. Su característica más importante es la persistencia de su acción antiparasitaria y repelente, lo que le otorga un prolongado poder residual.

**Composición.** Cipermetrina, 6 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

**Indicaciones. Control y tratamiento de ectoparásitos:** piojos chupadores y masticadores, y mosca de los cuernos en bovinos, ovinos, equinos y porcinos.

**Piojos:** el tiempo necesario para la eliminación parasitaria es de 4 a 6 semanas. En ovinos adultos, los tratamientos deben realizarse dentro de los 45 días después de la esquila. Los corderos pueden tratarse en cualquier momento.

**Dosis y vías de Administración. Bovinos:** 10 mL hasta 400 kg de p.v. y 20 mL para animales de más de 400 kg de p.v. Las dosis se pueden modificar según criterio profesional.

**Ovinos y porcinos:** 5 mL por animal.

**Equinos:** 20 mL, repartidos de la siguiente forma: 5 mL en la tabla del cuello y pecho y 5 mL en cada flanco e ijar. Aplicar por derrame cutáneo dorsal (pour-on).

**Recomendaciones.** No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

**Periodo de retiro.** Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 6 días. Entre el último tratamiento y el ordeño para el consumo humano y/o industrialización de la leche deben transcurrir 6 hs.

**Presentación.** Bidones dosificadores de 1 L.  
Bidones de 5 L.