



BAGODRYL

Acción. Antiséptico, desinfectante y germicida de superficie.

Composición. Combinación de Amonios Cuaternarios con acción biocida (bactericida y viricida) y de alta detergencia, en solución concentrada para diluir. Desinfectante general y de superficies fijas.

Cada 100 mL contiene Cloruro de Benzalconio 10 g, Cetrimida 5 g, excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. Desinfección general. Desinfección de instrumental quirúrgico, campo quirúrgico, manos del operario, lesiones externas de animales y ubres en el tambo pos ordeño, bebederos, instalaciones, máquinas, utensilios y superficies. Desinfección de materiales, dispositivos y áreas genitales en sistemas de inseminación artificial para eliminar virus, bacterias y protozoarios que afectan la reproducción.

Eficacia comprobada contra los siguientes microorganismos: Virus: Herpesvirus bovino (BoHV) tipo 1, virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV), Virus de la Influenza Tipo A H1N1; SARS-CoV-2, Virus de la Peste Porcina Africana (PPA); Rotavirus Bovino (RVB); Coronavirus Bovino (CCoV).

Bacterias: *Campylobacter fetus venereal*, *Leptospira pomona*, *Salmonella choleraesuis*; *Salmonella Stanley*; *Pseudomonas aeruginosa*; *Escherichia coli*; *Staphylococcus aureus*, *Bacillus anthracis*. **Hongos:** *Mucor sp.* **Protozoarios:** *Trichomonas foetus*.

Dosis y vía de administración. Desinfección externa prequirúrgica: 1:2.000 (1 mL en 2 L). Desinfección de instrumental quirúrgico: 1:200 (5 mL en 1 L). Desinfección externa de animales y ubres en el tambo: 1:2.000 (1 mL en 2 L). Desinfección de bebederos: 1:10.000 (1mL en 10 L). Desinfección de instalaciones, máquinas, utensilios y superficies contra el virus de influenza tipo A H1N1:1:200 (5 mL en 1 L o 50 mL en 10 L). Desinfección de materiales, dispositivos y áreas genitales en sistemas de inseminación artificial:1:200 (5 mL en 1 L o 50 mL en 10 L).

Agregar los mL necesarios de **BAGODRYL** en agua, mezclar y el producto estará listo para usar.

No utilizar limpiadores, lavandinas ni otros líquidos para disolver BAGODRYL.

Modo de Uso: La solución preparada de BAGODRYL puede aplicarse mediante aspersion, con paños húmedos o por inmersión. Se recomienda dejar actuar por 10 minutos. No requiere enjuague.

Es recomendable previo a la desinfección, remover la suciedad visible.

Presentación. Frasco de 1 L.