

ENDECTOCIDAS



BAGOMETINA® STAR

Acción. Antiparasitario interno y externo para bovinos, que combate parásitos gastrointestinales, pulmonares, garrapatas, miasis cutáneas, moscas y piojos. Solución inyectable de ivermectina al 3,15%.

Composición. Ivermectina, 3,15 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. Parásitos gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos): *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia* spp, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus* (adultos), *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Oesophagostomum radiatum*, *Ostertagia lyrata*, *Ostertagia Teladorsagia ostertagi* (incluyendo estadios inhibidos), *Strongyloides papillosus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Toxocara vitulorum*.

Parásitos pulmonares (estadios inmaduros, inhibidos y adultos): *Dictyocaulus viviparus*.

Garrapata: *Rhipicephalus microplus*. Aprobado como garrapaticida bovino en la prueba biológica, con una eficacia del 99,09% y un poder residual absoluto de 17 días. Autorizado para su uso en zona de control y zona indemne, focos de reinfestación con la indicación del Programa Nacional de Lucha contra la Garrapata.

Miasis cutáneas (estadios parasitarios): *Dermatobia hominis* (ura), *Cochliomyia hominivorax* ("bichera" o "gusanera"), *Hypoderma* spp, *Chrysomya bezziana*, *Cochliomyia macellaria*.

Piojos Chupadores: *Haematopinus eurystemus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*.

Control de miasis: Miasis de ombligo: aplicar una dosis en las primeras 24 hs. de nacimiento.

Miasis de castración: aplicar una dosis simultáneamente con la castración.

Dosis y vía de administración. 1 mL cada 50 kg de p.v. por vía subcutánea.

Periodo de retiro. No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 56 días desde el último tratamiento. No utilizar en hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización.

Presentación. Frasco de 500 mL.