



BIOABORTOGEN® H

Indicaciones. Vacuna para la prevención de enfermedades que provocan infertilidad y abortos en bovinos, ocasionados por los microorganismos presentes en la composición.

Composición. Suspensión acuosa inactivada de herpesvirus bovino (BoHV) tipo 1, virus de la diarrea viral bovina (BVDV) tipos 1 y 2 y cepas bacterianas de *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, *Histophilus somni* y *Leptospira interrogans Pomona pomona*.

Dosis y vía administración. 5 mL por vía subcutánea, en la tabla del cuello o detrás de la paleta.

Esquema de vacunación sugerido. Primovacunación (cualquier categoría que recibe esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Cría. Toros y vaquillonas: Primera dosis: 60 días previos al servicio o inseminación artificial (IA). Segunda dosis: 30 días previos al servicio o inseminación artificial (IA).

Vacas (revacunación): Aplicar 30 días previos al servicio o inseminación artificial (IA).

Tambo. Vaquillonas: Primera dosis: 60 días previos al servicio o inseminación artificial (IA). Segunda dosis: 30 días previos al servicio o inseminación artificial (IA).

Vacas y toros: Aplicar una dosis cada 6 meses. En vacas y vaquillonas de rodeos de cría y tambo con altas mermas en el período comprendido entre el tacto y la parición se sugiere aplicar una dosis al tacto.

Conservación. Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.
No congelar.

Presentación. Frascos de 125 mL y 250 mL.