



BIOCLOSTRIGEN® J5 2 mL

Indicaciones. Vacuna para la prevención de cuadros de mancha y gangrena gaseosa producidas por *Clostridium chauvoei* y *C. septicum*, y enterotoxemias producidas por *C. perfringens* tipos C y D. Contribuye a la prevención de cuadros entéricos o sistémicos producidos por toxinas de bacterias gram negativas. Para bovinos, ovinos y caprinos.

Composición. Cepas de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipos C y D y *Escherichia coli* J5 inactivadas con formaldehído y absorbidas en hidróxido de aluminio.

Dosis y vía administración. **Bovinos:** 2 mL vía subcutánea, en la tabla del cuello o detrás de la paleta.
Ovinos y caprinos: 1 mL vía subcutánea en tabla del cuello, en la axila o en el pliegue inguinal.

Esquema de vacunación sugerido. Primovacuna (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Bovinos: Terneros/as: primera dosis a los 2 meses de vida. Segunda dosis a los 3 meses de vida (antes de la marcación).

Invernada: 15 días antes del destete y antes de la época de incidencia (otoño-primavera).

Invernada y reposición (novillos, vaquillonas y toritos): 1er refuerzo a los 6 meses luego de la 2da dosis. Revacunación anual hasta los 2 años.

Transportes (remates, ferias): 15 días antes del transporte.

Ovinos y caprinos: Corderos/as y chivitos/as: 15 días antes del descole, señalada, castración, esquila.

Borregas preñadas: 1er dosis 60 días antes del parto. 2da dosis 30 días antes del parto.

Ovejas y cabras preñadas: 30 días antes del parto.

Majada general y carneros, chivos/ castrones: 15 a 30 días antes de la esquila.

En animales ya inmunizados se recomienda aplicar una dosis anual de refuerzo.

Conservación. Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.
No congelar.

Presentación. Frascos de 50 mL y 120 mL.