



# BIOPOLIGEN® AIR

**Indicaciones.** Vacuna para la prevención del síndrome respiratorio de los bovinos (complejo de enfermedades respiratorias, fiebre del transporte, neumonía) y cuadros reproductivos, nerviosos y entéricos provocados por la acción individual o combinada de los virus y bacterias presentes en la composición.

**Composición.** Cepas de herpesvirus bovino (BoHV) tipos 1 y 5, virus de la diarrea viral bovina (BVDV) tipos 1 y 2, virus de parainfluenza 3 (PI3) y virus sincial respiratorio bovino (BRV) inactivados con BEI y cepas bacterianas de *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni* inactivadas con formaldehído y emulsionadas en adyuvante oleoso.

**Dosis y vía administración.** 3 mL por vía subcutánea o intramuscular en la tabla del cuello.

**Esquema de vacunación sugerido. Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez):** 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

**Terneros de destete convencional (primovacunación):** Primera dosis: 45 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

**Terneros de destete precoz:** Primera dosis: 30 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

**Animales transportados (primovacunación):** Primera dosis: 30 días antes del transporte. Segunda dosis: 15 días antes del transporte.

**Animales transportados (revacunación):** 15 días antes del transporte.

**Animales que ingresan a invernada o feedlot (primovacunación):** Primera dosis: al ingreso. Segunda dosis: 21 días después.

**Vacas y vaquillonas (rodeo de cría):** Primera dosis: séptimo mes de preñez. Segunda dosis: octavo mes de preñez.

**Vacas y vaquillonas (tambo):** Primera dosis: al secado. Segunda dosis: al parto.

**Conservación.** Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.  
No congelar.

**Presentación.** Frascos de 120 mL y 240 mL.