



# BIOPOLIGEN® HS

**Indicaciones.** Vacuna para la prevención del síndrome respiratorio en bovinos (complejo de enfermedades respiratorias, fiebre del transporte, neumonía) y cuadros reproductivos, neurológicos y entéricos asociados a la acción individual o combinada de los virus y bacterias presentes en la composición.

**Composición.** Suspensión acuosa inactivada de herpesvirus bovino (BoHV) tipos 1 y 5, virus de la diarrea viral bovina (BVDV) tipos 1 y 2, virus de parainfluenza 3 (PI3), *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* e *Histophilus somni*.

**Dosis y vía administración.** 5 mL por vía subcutánea.

**Esquema de vacunación sugerido. Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez):** 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

**Terneros de destete convencional (primovacunación):** Primera dosis: 45 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

**Terneros de destete precoz:** Primera dosis: 30 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

**Animales transportados (primovacunación):**

Primera dosis: 45 días antes del transporte. Segunda dosis: 15 días antes del transporte.

**Animales transportados (revacunación):** 15 días antes del transporte.

**Animales que ingresan a invernada o feedlot:** Vacunar al ingreso; si no tienen antecedentes de vacunación previa, revacunar a los 15-21 días.

**Vacas y vaquillonas gestantes:** Primera dosis: 60 días antes del parto. Segunda dosis: 30 días antes del parto.

**Conservación.** Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.  
No congelar.

**Presentación.** Frascos de 125 mL y 250 mL.