



# CEFTIOMAX

**Acción.** Solución antibiótica inyectable de amplio espectro para bovinos y porcinos.

**Composición.** Ceftiofur base (como clorhidrato), 5 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

**Indicaciones.** Control de las infecciones bacterianas más comunes causadas por bacterias gram negativas y positivas. Indicado para uso en bovinos de cualquier edad y tipo de producción, incluso vaquillonas y vacas en producción láctea; y en porcinos, en lechones y cerdos de engorde y cría.

**Bovinos:** Tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (BRD), fiebre del embarque o neumonía bovina, asociada a *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*. Tratamiento de la necrobacilosis interdigital aguda (pododermatitis infecciosa, "foot-rot" o pododermatitis) asociadas a *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melanogenicus*. Tratamiento de la metritis aguda y de posparto asociadas a microorganismos sensibles al ceftiofur.

**Porcinos:** Tratamiento y control de la enfermedad bacteriana de los cerdos (neumonía) asociada con *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis* tipo 2.

Eficaz frente a infecciones por *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Haemophilus pleuropneumoniae*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis* y *S. bovis*.

**Dosis y vía administración. Bovinos:** 1 a 2 mL cada 50 kg de p.v. por vía intramuscular o subcutánea.

**Porcinos:** 0,5-1 mL cada 10 kg de p.v. por vía intramuscular profunda exclusivamente.

En ambas especies se debe repetir la dosis cada 24 hs. durante 3 días como mínimo. Queda a criterio del profesional actuante prolongar los tratamientos.

**Periodo de retiro.** No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 2 días del último tratamiento. No posee periodo de retiro en cuanto a la leche.

**Presentación.** Frasco de 100 mL.