

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



CIPERSIN®

Acción. Garrapaticida bovino, antisárnico y melofagucida ovino. Líquido emulsionable.

Composición. Cipermetrina, 20 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. Control y tratamiento de garrapatas (*Rhipicephalus microplus*) en bovinos, sarna ovina (*Psoroptes communis* var. *ovis*) y *Melophagus ovinus*.

Dosis y vías de Administración. Garrapaticida bovino contra la garrapata común del bovino (*Rhipicephalus microplus*). **Pie de baño:** 1 L por cada 1.000 L de agua dulce o salobre (1:1000).

Reposición y refuerzo: Se recomienda efectuar estas operaciones cuando el nivel del baño descienda 1.000 L; se debe hacer en forma simultánea la reposición y refuerzo a razón de 1,5 L de CIPERSIN® por cada 1.000 L de agua (1,5:1000).

Refuerzo en seco: En caso de que se desee continuar bañando sin reponer agua se debe agregar CIPERSIN® en una proporción de 0,5 L de producto por cada 1.000 L de agua que baje el nivel del bañadero (0,5:1000).

Para limpieza de tropas: Dar 2 baños con 9 días de intervalo. Mantener a cada animal alrededor de 15 segundos en el agua y sumergir la cabeza íntegramente 3 veces.

Para baños generales: Dar 2 baños con 21 días de intervalo.

Antisárnico ovino contra la sarna ovina (*Psorotes communis* var. *ovis*)

Pie de baño: 1 L por cada 1.000 L de agua dulce o salobre (1:1000).

Reposición y refuerzo: 2 L cada 1.000 L de agua dulce o salobre (2:1000).

Refuerzo en seco: En caso de que se desee continuar bañando sin reponer agua, se debe agregar CIPERSIN® en la proporción de 1 L de producto por cada 1.000 L de agua que baje el nivel del bañadero (1:1000). Para combatir la sarna ovina, se debe realizar un segundo baño entre 9 y 11 días después del primero, con un pie de baño nuevo.

Melofagucida ovino contra el melófago (*Melophagus ovinus*) o falsa garrapata.

Pie de baño: 1 L de CIPERSIN cada 1.000 L de agua dulce o salobre (1:1000). La repetición del baño como melofagucida queda a criterio del profesional actuante.

Recomendaciones. No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

Periodo de retiro. Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 48 hs. Entre el último tratamiento y el ordeño para consumo humano y/o industrialización de la leche deben transcurrir 48 hs.

Presentación. Bidón de 5 L.