

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



FORBOX FT

Acción. Antiparasitario externo de amplio espectro para bovinos. Garrapaticida, mosquicida, piojicida, larvicida de aplicación pour on.

Composición. Fluazurón 3 g; Cipermetrina 4 g; Imidacloprid 4 g; Excipientes c.s.p 100 mL.

Indicaciones.

Garrapatas: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma*. Poder residual: 32 días. Eficacia 99,06%.

Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

Piojos chupadores: *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*, *Linognathus vituli*.

Piojos masticadores: *Damalinia (Bovicola) bovis*.

Ura (*Dermatobia hominis*).

Miasis cutáneas, "bicheras" o "gusaneras" (*Cochliomyia hominivorax*).

Otros insectos hematófagos: Mosca brava (*Stomoxys calcitrans*), **Tábanos** (*Tabanidae spp.*) y **Mosquitos**.

Dosis y vías de Administración. 1 ml cada 10 kg de peso vivo. Aplicar por derrame cutáneo dorsal (pour on) en dos franjas, paralelas a la línea media dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola.

Período de retiro. Carne: 17 días.

No utilizar en hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano.

Recomendaciones. No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

Presentaciones. Bidones mochila de 2,5 litros y bidones de 5 litros.