

## ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



# GALMETRIN® PLUS POMADA



**Acción.** Larvicida externo. Pomada antimiasica para bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos.

**Composición.** Cipermetrina, 2 g; diclorvós, 1 g; excipientes, c.s.p. 100 g.

**Indicaciones.** Indicado especialmente para combatir las miasis producidas por *Cochliomyia hominivorax*, *Lucilia cuprina* y *L. sericata* en bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos. Tiene acción residual por 12 días.

**Modo de administración.** Para el tratamiento de las miasis se debe proceder a cubrir bien las cavidades y superficies de las heridas, para así poder eliminar las larvas, activar y facilitar la cicatrización. Como preventivo se recomienda **GALMETRIN® PLUS POMADA** en las heridas ocasionadas por esquila, señalada, descole, descorne, castración, etc. El efecto residual de **GALMETRIN® PLUS POMADA** es prolongado; no obstante, en épocas de mucha incidencia de moscas, conviene repetir el tratamiento con intervalos de 12 días.

**Periodo de retiro.** Entre el último tratamiento y la faena para consumo humano deben transcurrir 48 hs. Entre el último tratamiento y el ordeño para consumo humano y/o industrialización de la leche deben transcurrir 48 hs.

**Presentación.** Pote de 1 kg.