



MAXIBIOTIC LA

Acción. Solución antibiótica inyectable de amplio espectro y acción prolongada para bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

La naturaleza del excipiente de ésta preparación permite:

- Obtener tasas plasmáticas y en tejidos elevadas e inmediatamente eficaces.
- Mantener estas tasas durante tres a cinco días.
- Tratar infecciones con una sola administración aún cuando se trate de procesos agudos.

El espectro de acción de **MAXIBIOTIC LA** es muy amplio, abarcando gérmenes Gram (+) y Gram (-); Micoplasmas, Protozoarios, Rickettsias, Clamidias y Actinomicetos.

Composición. Oxitetraciclina base 20 gr; excipiente de acción prolongada c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. Bovinos: Neumopatías y gastroenteritis infecciosas, abortos de origen infeccioso, infecciones articulares, pododermatitis, artritis, queratoconjuntivitis infecciosa. Porcinos: Neumopatías y gastroenteritis infecciosas, metritis, mastitis, agalactia, abortos de origen infeccioso, rinitis atrófica. Ovinos y caprinos: pododermatitis infecciosa, abortos provocados por Clamidias y Salmonellas.

Otras indicaciones. Neumonía del transporte, anaplasmosis, piroplasmosis, leptospirosis y carbunco sintomático.

Dosis y vía administración. 1 mL cada 10 kg de p.v. (20mg/kg p.v.) por vía intramuscular profunda en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos; y por vía subcutánea en lechones menores de 10 kg de p.v. En caso de infecciones graves, puede aplicarse otra dosis a los tres días.

Periodo de retiro. Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 28 días. No usar en animales en ordeño cuya leche se destine a consumo y/o industrialización.

Presentación. Frasco de 250 mL.