



MAXITYL® PLATINUM

Acción. Antibiótico y antiinflamatorio. Solución antibiótica inyectable de amplio espectro y acción prolongada para bovinos. Es una asociación de un antibiótico de amplio espectro (tilmicosina) con un antiinflamatorio no esteroide (ketoprofeno), en la que la tilmicosina actúa como un quimioterápico, al mismo tiempo que el ketoprofeno reduce el dolor, la inflamación y la fiebre.

Composición. Cada 100 mL contiene: tilmicosina, 30 g; ketoprofeno, 9 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. La acción combinada de los dos principios activos de la formulación de **MAXITYL® PLATINUM** permite, por un lado, el tratamiento de la enfermedad respiratoria en bovinos, fundamentalmente asociada a la fiebre del embarque provocada por *Mannheimia (pasteurella) haemolytica*, tratamiento de pododermatitis infecciosa, neumonía en terneros y el síndrome de QIB (queratoconjuntivitis infecciosa bovina) por acción de la tilmicosina; mientras que el aporte de ketoprofeno alivia el dolor, reduce la fiebre y la inflamación asociadas a cualquier proceso infeccioso, lo que mejora el estado general del animal y le permite recuperar su apetito. Los agentes etiológicos susceptibles a **MAXITYL® PLATINUM** son: *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni (Haemophilus somnus)*, *Mycoplasma dispar*, *Mycoplasma bovis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Actinomyces pyogenes*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Moraxella bovis*, *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium necrophorum*.

Dosis y vía administración. 1 mL cada 30 o 60 kg de p.v., según criterio del profesional actuante, equivalente a 5 a 10 mg/kg de tilmicosina y 1,5 a 3 mg/kg de ketoprofeno. En general se utilizan dosis únicas. En caso de no notar una mejoría a las 48 hs., reevaluar el diagnóstico. **Neumonía:** 1 mL/30 kg de p.v. **Pododermatitis infecciosa:** 1 mL/60 kg de p.v. **Queratoconjuntivitis:** 1 mL/60 kg de p.v. Se administra por vía subcutánea en la región del cuello o por detrás de la paleta, con jeringas comunes y agujas 12/18. No utilizar jeringas automáticas. NO ADMINISTRAR POR VÍA ENDOVENOSA, YA QUE PUEDE SER FATAL.

Precauciones. Utilizar sólo en bovinos. El uso en otras especies puede ser fatal. Manipular con precaución, la inyección accidental puede resultar fatal para el hombre.

Periodo de retiro. Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 28 días. No usar en vacas en ordeño cuya leche se destine a consumo y/o industrialización.

Presentación. Frasco de 100 mL.