

ANTIPARASITARIOS INTERNOS



PARAXANE® INYECTABLE

Acción. Antiparasitario interno inyectable de efecto ovicida para bovinos.

Composición. Ricobendazol, 10 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. Tratamiento y control de las siguientes especies de parásitos gastrointestinales y pulmonares en el ganado bovino: *Haemonchus* spp, *Ostertagia (Teladorsagia)* spp (incluso las formas hipobióticas), *Trichostrongylus* spp, *Cooperia* spp, *Nematodirus* spp, *Oesophagostomum* spp, *Bunostomum* spp, *Dictyocaulus* spp.

PARAXANE® INYECTABLE es efectivo en un rango superior al 99% contra los parásitos adultos y superior al 94% contra formas inhibidas. Acción prolongada (96 hs.), amplio margen de seguridad y gran poder ovicida (a partir de las 6 hs. pos tratamiento).

Dosis y vía de administración. Aplicar por vía subcutánea exclusivamente, delante o detrás de la paleta. Se dosifica a razón de 2,5 a 8 mg/kg de p.v.

Se aconsejan las siguientes dosis: 1 mL cada 40 kg de peso y hasta 1 mL cada 12,5 kg de peso, de acuerdo al ciclo parasitario y al criterio del profesional actuante.

Dosis	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg
Parásitos Adultos	2,5 mL	5 mL	7,5 mL	10 mL
Larvas Hipobióticas	8 mL	16 mL	24 mL	32 mL

Periodo de retiro. Debido a su formulación de larga acción y a su permanencia en los tejidos, no se puede enviar a faena para consumo humano hasta transcurridos 49 días del último tratamiento. Entre el último tratamiento y el destino de la leche para consumo humano y/o industrialización deben transcurrir 120 horas (10 ordeñes).

Presentación. Frasco de 1 L.