



POLICLOSTRIGEN

Indicaciones. Vacuna para la prevención de las siguientes enfermedades en bovinos y ovinos causadas por clostridios: mancha, gangrena gaseosa, enterotoxemia, hepatitis necrótica infecciosa, hemoglobinuria bacilar y muerte súbita. Prevención de cuadros de endotoxemia producidos por bacterias gram negativas.

Composición. Suspensión acuosa inactivada de bacterinas y toxoides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium sordelli*, *Clostridium perfringens* tipo C y D, *Clostridium novyi* y *Clostridium haemolyticum* combinados con bacterina de *Escherichia coli* J5. La combinación de toxoide de *Clostridium perfringens* tipo C y toxoide de *Clostridium perfringens* tipo D confiere protección contra *Clostridium perfringens* tipo B.

Dosis y vía administración. Bovinos: 5 mL.

Ovinos: 3 mL.

Vía: subcutánea.

Esquema de vacunación sugerido. Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Bovinos: Terneros/as: primera dosis a los 2 meses de vida. Segunda dosis a los 3 meses de vida (antes de la marcación).

Invernada: 15 días antes del destete y antes de la época de incidencia (otoño-primavera).

Invernada y reposición (novillos, vaquillonas y toritos): 1er refuerzo a los 6 meses luego de la 2da dosis. Revacunación anual hasta los 2 años.

Transportes (remates, ferias): 15 días antes del transporte.

Ovinos y caprinos: Corderos/as y chivitos/as: 15 días antes del descole, señalada, castración, esquila.

Borregas preñadas: 1er dosis 60 días antes del parto. 2da dosis 30 días antes del parto.

Ovejas y cabras preñadas: 30 días antes del parto.

Majada general y carneros, chivos/ castrones: 15 a 30 días antes de la esquila. Ingreso a verdeos o cambios de alimentación. En animales adultos vacunados se recomienda una dosis anual de refuerzo. En zonas de alta incidencia de *Clostridium novyi* y *Clostridium haemolyticum* se recomienda la vacunación cada 6 meses. Se aconseja la revacunación ante cuadros de parasitosis gastrointestinales.

Conservación. Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.

No congelar.

Presentación. Frascos de 125 mL y 250 mL.