



ROTATEC J5®

Indicaciones. Vacuna para la prevención del síndrome de la diarrea neonatal del ternero causado por rotavirus bovino y bacterias gram negativas; endotoxemias secundarias a infecciones por bacterias gram negativas y mastitis por coliformes en vacas de tambo.

Composición. Emulsión oleosa inactivada de rotavirus bovino serotipos 6 y 10 y *Escherichia coli* J5.

Dosis y vía administración. 3 mL vía intramuscular o subcutánea, en la tabla del cuello.

Esquema de vacunación sugerido. Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Rodeos de cría. Vacas y vaquillonas (primovacunación): Primera dosis: séptimo mes de preñez. Segunda dosis: octavo mes de preñez.

Vacas y vaquillonas (revacunación): Aplicar una dosis al octavo mes de preñez. Se sugiere en rodeos con alta incidencia: primera dosis séptimo mes de preñez, segunda dosis octavo mes de preñez y una tercera dosis a las vacas cola de parición.

Tambo. Vacas y vaquillonas (primovacunación): Primera dosis: séptimo mes de preñez. Segunda dosis: octavo mes de preñez.

Vacas y vaquillonas (revacunación): Primera dosis: secado. Segunda dosis: parto.

Para prevención de mastitis coliforme aplicar una tercera dosis al parto.

Conservación. Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.
No congelar.

Presentación. Frascos de 120 mL y 240 mL.