

ANTIINFLAMATORIOS



UBREDEM BIOGÉNESIS BAGÓ



Acción. Solución inyectable, antiinflamatoria y antiedematosa para bovinos. Asociación diurético corticoide.

Composición. Furosemida 5,00 g; Dexametasona base (como 21-fosfato) 0,05 g; Vehículo, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. Tratamiento de Edema de ubre en vacas lecheras. Edemas inflamatorios y no inflamatorios. Otros casos en que sea necesario incrementar la diuresis, por ejemplo: dilución del contenido bacteriano en infecciones urinarias, excreción necesaria por vía renal de principios tóxicos, toxemia de la preñez, etc.

Dosis y vía administración. Vacas con edema de ubre: 10 mL por día, repartidos en dos aplicaciones de 5 mL c/u, separadas entre sí por un intervalo de 12 horas.

De no ser imprescindible, no prolongar el tratamiento más allá de las 48 horas. Puede ser administrado por vía intramuscular o endovenosa lenta.

Periodo de retiro. No destinar para consumo o industria, la leche de los seis ordeñes posteriores al último tratamiento.

No sacrificar los animales para consumo humano hasta transcurridas 72 horas del último tratamiento.

Presentación. Frasco de 25 mL.