



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
VACUNAS													
BIOPOLIGEN® HS / BIOPOLIGEN® AIR		Dosis pre destete						1° refuerzo					Complejo respiratorio bovino
BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML / POLICLOSTRIGEN®		Dosis pre destete						1° refuerzo					Enf. Clostridiales
BIOQUERATOGEN® OLEO MAX		Dosis pre destete						1° refuerzo					Queratoconjuntivitis
BIO-CARBOGEN 2										Dosis anual			Carbunco
BIOLEPTOGEN®		Dosis pre destete						1° refuerzo					Leptopirosis
BIOABORTOGEN® H								1° dosis		2° dosis			Enf. reproductivas en vaquillonas con servicio de 15 meses
CONTROL DE PARÁSITOS													
BAGOMECTINA® / FLOK® 1,1 % / FLOK® 3,15 %			Dosis destete								Dosis O. Inhibida		Control de parásitos internos y externos según diagnóstico
PARAXANE® INY.								Dosis					Control de parásitos internos según hpg
FOSFAMISOL® M.V.						Dosis							Control de parásitos internos según hpg
ARRASA® / ACIENDEL® PLUS / ACIENDEL® / ASPERSÍN®					Dosis piojos							Dosis moscas	Control de parásitos externos según diagnóstico
VITAMINAS Y MINERALES													
ADAPTADOR® MIN Y ADAPTADOR® VIT			Dosis destete							Dosis preservicio			Suplemento de vitaminas y minerales
SUPLENUT®					Dosis			Dosis				Dosis	Cobre + zinc

Plan Sanitario sugerido para animales que van desde un destete de 7/8 hasta los 15 meses de edad y que llegaron al destete con el plan sanitario al pie de la madre aplicado.

La elección de productos para el control de parásitos tanto internos como externos quedara sujeta a criterio profesional veterinario y a los antecedentes de fallas en los tratamientos o resistencia a los distintos principios activos del establecimiento.

De acuerdo a los productos seleccionados para el control de parásitos externos, por baños pour on o aspersión, se deberá repetir el tratamiento según ciclo del parásito a controlar.